

Информация



© New Africa – stock.adobe.com

Информация об анестезии при операциях детей

В день операции

В зависимости от операции, детей либо принимают накануне в одно из детских отделений, либо назначают время прибытия в отделение в день операции (Same-day surgery-Zentrum, SDSZ). По этому поводу вы получите подробную информацию дополнительно.

Еда и питьё

В очень редких случаях при введении общего наркоза содержимое желудка может подняться обратно в горло и попасть в лёгкие. Это называется аспирация и может привести к воспалению лёгких. Для ее предотвращения важен пустой желудок. Поэтому следует соблюдать следующие правила относительно еды и питья:

- Более чем за **шесть часов** до начала наркоза разрешена любая пища.
- Между **шестью и четырьмя часами** до начала наркоза разрешены непрозрачные жидкости, как, например, коровье молоко или какао (200 мл) либо маленькая порция йогурта (150 г) или баночка детского питания
- Материнское молоко допустимо не позднее **трёх часов** до начала наркоза.
- Всем детям **следует** пить прозрачные, негазированные жидкости (чай, прозрачные соки без мякоти, воду) не позднее **одного часа** до начала наркоза во избежание нехватки жидкости и беспокойства из-за чувства голода или жажды.

Оставлять детей без еды или питья дольше, чем обязательно нужно, **не имеет смысла!** Из этого не следует лучшая защита от аспирации. Наоборот, долгое время без еды и питья ухудшает самочувствие детей, а нехватка жидкости может привести к проблемам во время операции.

Пластыри для местной анестезии

Чтобы вставление внутривенного катетера стало бы менее неприятным, детям наклеивают два „волшебных пластыря“ с местным обезболивающим на руки или ступни. Имеющийся на пластырях крем должен подействовать 45-60 минут, чтобы обезболить кожу в этом месте.

Если вы приезжаете в больницу только в день операции, пожалуйста попросите, чтобы вам эти пластыри дали бы с собой заранее и наклейте их уже дома. Точные инструкции вам дадут в предварительном собеседовании с анестезиологом.

Успокоительный сироп

В большинстве случаев дети от шести месяцев получают успокоительный сироп незадолго до наркоза. Сироп делает детей спокойными и несколько усталыми, они испытывают меньше страха и стресса и забывают возможные неприятные воспоминания.

При коротких наркозах для диагностики (МРТ, Колоноскопия, Гастроскопия и т.д.) мы даем успокоительные медикаменты непосредственно перед наркозом внутривенно.



Сопровождение

Расставание с родителями - самый трудный момент для детей и для вас. В этот момент важнее всего избегать страха и стресса для детей.

Чтобы ваш ребёнок чувствовал бы себя комфортно в чужом окружении, мы просим вас дать ему с собой на операцию маленькую игрушку или мягкого зверя и т.п. Дети постарше могут слушать музыку через наушники или играть на планшете, если они принесут с собой соответствующие приспособления.

Мы введём вашего ребёнка уже на входе в операционное отделение в частичный наркоз, или предложим вам сопровождать его в операционный зал до того момента, как он заснёт, если обстоятельства это допускают. Это не касается новорождённых и маленьких грудных детей, так как они ещё не различают „своих“ и „чужих“ людей и не воспринимают разлуку с родителями как что-то устрашающее.



Введение наркоза

Для введения общего наркоза, необходимые медикаменты вводятся внутривенно, если у вашего ребёнка уже есть внутривенный катетер или его можно поставить непосредственно и без стресса для ребёнка. В порядке исключения, здоровые дети без внутривенного катетера могут вдыхать наркозный газ через маску, от чего они засыпают через несколько вдохов, после чего мы вставляем внутривенный канал под наркозом.

После операции

После операции мы привозим вашего ребёнка в палату пробуждения. Мы вам об этом сообщим, чтобы один из родителей имел возможность непосредственно попасть к ребёнку. В палате пробуждения мы дальше наблюдаем за функцией дыхания и кровообращения. Кроме того, мы следим за тем, чтобы действие обезболивающих медикаментов было бы достаточным.

В редких случаях, непосредственно после наркоза может наступить беспокойство, возбуждение и страх. Это не признак „неперенесения“ наркоза. Симптомы исчезнут через некоторое время без следа. Тем не менее, ситуация очень неприятна для всех участвующих. Поэтому мы вашего ребёнка в это время поддерживаем успокоительными медикаментами, обезболиванием и спокойной атмосферой в палате пробуждения.

В палате пробуждения для всех детей есть замороженный сок как освежающее и награда за прекрасное поведение!

Если ваш ребёнок достаточно бодр и не чувствует боли, он переводится обратно в детское отделение, или, при амбулаторных операциях, отпускается домой.

Информация о контакте

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen

Отделение анестезиологии

Директор: Проф. доктор мед. наук Ян Ларман

Секретариат

Тел. 0241 80-88179
anaesthesiologie@ukaachen.de

Дальнейшая информация

Дальнейшую, подробную информацию вы сможете найти на интернетной странице отделения анестезиологии под разделом „Kinderanästhesie“

