

| Übersicht Studien Viszeralonkologie 2024 | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Indikation | Kurzname | Behandlung | Therapie |
| Gastroösophageal | NIS INGA | Nicht interventionell | Nivolumab plus Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung von Adenokarzinomen des Magens, des gastroösophagealen Übergangs oder des Ösophagus und Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus (ESCC) sowie zu Nivolumab plus Ipilimumab bei ESCC |
| | Hipec-Flot 9 | Präventiv Kurativ | Präventive HIPEC in Kombination mit perioperativer FLOT versus FLOT allein bei reresektablen diffusen Typ Magen- und gastroösophagealer Karzinome und Übergang Typ II/III Adenokarzinom |
| Pankreas | Holipanc | Neoadjuvant | Chemotherapie aus liposomalem Irinotecan kombiniert mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil/Folinsäure, gefolgt von kurativer Resektion bei Patienten mit auf die Leber beschränktem oligometastatischem Adenokarzinom des Pankreas |
| | Metapanc | Neoadjuvant | METAPANC -Intensivierte Behandlung bei Patienten mit oligometastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs - multimodale chirurgische Behandlung gegen-über alleiniger systemischer Chemotherapie: eine randomisierte kontrollierte Studie |
| | ESPAC 6 | Adjuvant | Eine offene Phase-III-Studie zur Wirksamkeit einer Chemotherapie nach Operation beim duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse, wobei die Zuteilung zur Oxaliplatin basierten oder Gemcitabin-basierten Chemotherapie entweder nach klinischen Standardkriterien oder nach genetischen Markern erfolgt |
| | TransNiDeG | Chirurgisch | TransNiDeG – Die Wirkung von transkutan appliziertem Nikotin auf die Entwicklung einer Magenentleerungsstörung nach partieller Pankreatoduodenektomie - eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppelblinde multizentrische Studie |
| | Pan-Rec-3 | Chirurgisch | Randomisierte Single-Center Studie zum Vergleich der Standard-Pankreaskopfresektion versus Pankreaskopfresektion mit der Level-III Dissektion (Pan-Rec-3) via „Artery first approach“ bei primär resektablen Pankreaskarzinom |
| Gallenwege | NeoTreme | Neoadjuvant | Phase II Studie zur Untersuchung von prä-operativem Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit Durvalumab (MEDI4736) und Tremelimumab bei Patienten mit intrahepatischem Gallengangkarzinom |
| | CARP | Palliativ | Behandlung von Cholangiokarzinomen mit Radiofrequenzablation oder photodynamischer Therapie |
| Leber | ABC HCC | Palliativ | Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom |
| | Demand | Palliativ | Studie zur Wirksamkeit von Atezolizumab und Roche Bevacizumab (Atezo/Bev) gefolgt von einer selektiver TACE (sdTACE) bei Erkennung einer Krankheitsprogression |
| | LIVER-R | Nicht interventionell | Multizentrische Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Behandlungsergebnisse von Durvalumab-basierten Therapien bei hepatobiliären Krebserkrankungen unter realen Bedingungen |
| Kolorektal | Circulate | Adjuvant | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung |
| | Bering CRC | Nicht interventionell | Chemotherapie-freie Therapie mit dem BRAF-Inhibitor Encorafenib und dem anti-EGFR Antikörper Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E-mutiertem Kolorektalkarzinom gemäß Fachinformation. |
| | ALLIES | Nicht interventionell Ernährungs- supplementation | Muskelmasse bei Patienten mit kolorektalem oder Lungenkrebs bei Erhalt eines mit n-3 PUFA und Leucin angereicherten oralen Nahrungsergänzungsmittels mit hohem Protein- und Energiegehalt während der Krebsbehandlung. |