

Kopf-Hals-Tumore

Nasopharynxkarzinom

Erstlinie

NPC-Nivo Phase II

- Nivolumab in Kombination mit Cisplatin, 5-Fluorouracil
- Kinder (≥ 3 J.) und Erwachsene
 - EBV positiv
 - Erwachsene: Stadium III-IV

Plattenepithelkarzinom

Rezidiert/ metastasiert

Zweitlinie

Erstlinie

GSK 219885

Phase II

Firstline r/m HNSCC

Dostarlimab (anti-PD1) vs Dostarlimab + anti TIGIT vs Dostarlimab + anti CD96 vs Dostarlimab + anti TIGIT + anti CD96

- PD-L1 positiv (CPS ≥ 1)
- IO naive Patienten
- Systemtherapie i.R. komb RCTx > 4 Monate
- PD > 4 Monate nach kurativer Therapie

HB-200, Hookipa Pharma

Phase II/III

Firstline r/m OPC HPV16 positive CPS ≥ 20

HB-202 und HB-201 (Vektortherapie) + Pembrolizumab vs. Pembrolizumab mono (400mg alle 6 Wo ab C3)
REKRUTIERUNG ab 01/2025

Bicara Phase II/III Firstline

BCA101 (BiTE EGF/TGFbeta + Pembrolizumab vs. Pembrolizumab mono

REKRUTIERUNG

CPS ≥ 1 , HPV negativ

- PD > 6 Monate nach kurativer Therapie
 - Auswahl ab Q3/24 (Stand 04/2024)
- Start Q1/2025**

MERUS MCLA-158-CL02

Phase III Secondline

Petosemtamab (BiTE EGF-R und LGR5 vs. IC (Docetaxel, MTX, Cetuximab)

REKRUTIERUNG

- Rezidiv oder Progress nach Platin und nach PD-L1/PD-1 Therapie
- Start Q4/2024**